

Деркаев А.А., Рябова Е.И., Есмагамбетов И.Б., Щебляков Д.В., Носков А.Н.,
Виноградова И.Д., Прокофьев В.В., Полянский Д.С., Логунов Д.Ю., Гинцбург А.Л.

Кандидатный препарат на основе модифицированных однодоменных антител для терапии ботулизма, вызванного...

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2025-591-table2>

Таблица 2. Содержание гликанов в препарате однодоменного антитела B11-Fc

Table 2. Glycan content of the B11-Fc single-domain antibody preparation

Показатель <i>Parameter</i>	Группа гликанов <i>Glycan group</i>								
	G0-N	G0F-N	G0	G0F	Man5	G1	G1F	G2F	G2+G2
Количественное содержание в препарате, % <i>Content, %</i>	0–2	0–2	0,5–5	30–50	1–5	1–5	15–25	5–15	0

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Приложение. G0-N — агалактозилированные гликаны, содержащие дополнительный глюкозамин; G0F-N — агалактозилированные фукозилированные гликаны, содержащие дополнительный глюкозамин; G0 — агалактозилированные гликаны; G0F — агалактозилированные фукозилированные гликаны; Man5 — высокоманнозилированные гликаны, G1 — галактозилированные гликаны; G1F, G2F — галактозилированные фукозилированные гликаны; G2+G2 — высокогалактозилированные гликаны.

Note. G0-N, agalactosylated glycans with additional glucosamine; G0F-N, agalactosylated fucosylated glycans with additional glucosamine; G0, agalactosylated glycans; G0F, agalactosylated fucosylated glycans; Man5, highly mannosylated glycans, G1, galactosylated glycans; G1F, G2F, galactosylated fucosylated glycans; G2+G2, highly galactosylated glycans.