

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2025-25-4-376-388-fig-s1>




Рисунок подготовлен авторами по собственным данным / The figure is prepared by the authors using their own data

Рис. S1. Влияние внутримышечного введения комбинированного препарата на основе антирабических моноклональных антител докаравимаба и мирамавимаба (комбинированный препарат) и препарата сравнения (Ребинолин) на массу тела мышей BALB/c: А — самцы, введение препаратов через 6 ч после инфицирования штаммами вируса бешенства; В — самки, введение препаратов через 6 ч после инфицирования; С — самцы, введение препаратов через 24 ч после инфицирования; D — самки, введение препаратов через 24 ч после инфицирования. Обозначения в легенде: опытные группы мышей с указанием препарата и вируса (в скобках) и контрольные группы.

Fig. S1. Effect of the combined preparation based on docaravimab and miromavimab anti-rabies monoclonal antibodies (combination preparation) and the comparison drug (Rebinolin) on body weight of BALB/c mice (intramuscular injection): A — males, drug injection 6 hours after infection with rabies virus strains; B — females, drug injection 6 hours after infection; C — males, drug injection 24 hours after infection; D — females, drug injection 24 hours after infection. Legend: experimental mice groups indicating drug and virus (in parentheses) and control groups.